



Warn-
zeichen

Angeborene Immundefekte

Warnzeichen bei Kindern

- ▶ Angeborener Immundefekt in der Familie
- ▶ Acht oder mehr Mittelohrentzündungen im Jahr
- ▶ Zwei oder mehr Entzündungen der Nasennebenhöhlen im Jahr
- ▶ Zwei oder mehr Lungenentzündungen im Jahr
- ▶ Antibiotika-Behandlung über zwei oder mehr Monate ohne Wirkung
- ▶ Komplikationen bei Lebendimpfungen (z. B. gegen Rotavirus oder Kinderlähmung)
- ▶ Wiederkehrende oder ausgedehnte Infektionen mit atypischen Mykobakterien (normalerweise ungefährliche Bakterien)
- ▶ Wiederkehrende Abszesse (Ansammlungen von Eiter) tief in der Haut oder an inneren Organen
- ▶ Zwei oder mehr schwere Infektionen wie z. B. Hirnhautentzündung, eitrige Knochen- oder Gelenkentzündung oder Blutvergiftung (Sepsis)
- ▶ Dauerhafter Pilzbelag an Haut oder Schleimhaut nach dem ersten Lebensjahr
- ▶ Unklare chronische Rötungen bei Säuglingen an Händen und Füßen (durch chronische "Graft vs. Host Reaktion")
- ▶ Wachstumsstörungen bei Säuglingen, mit und ohne chronische Durchfälle

CSL Behring